




السنط



الجنس *Acacia* ينتمي إلى فصيلة النجميات
.des mimosalées

هي نباتات الوديان الكبرى والمنخفضات، شجرة كثيفة الأوراق تبسطها في الهواء الدافئ، أوراق مجزئة مرتين ومكونة من 4 أزواج ريشية، تحتوي على وريقات صغيرة والطريقة الوحيدة لمكافحة التبخر هي تحرك خفيف للوريقات التي تتحني فوق بعضها البعض وذلك لترك

مساحة محدودة معرضة للهواء الطلق.

نجد جنس الطحة في الجنوب الجزائري، المغربي والتونسي، في ليبيا وفي مصر. قبل جفاف الصحراء، في نهاية عصر ما قبل التاريخ وفي العصر النيولتيك، رقعة الطحة قد لعبت نفس الدور العازل بالنسبة للبلاد البربرية مع البحر الأبيض المتوسط. كانت تتواجد في هذا السبب الضخم سلاسل جبلية، حظائر من الميموزا، تربط بين الهضاب العليا الجزائرية، والسهوب إلى مجموعات البطم و *Jujubier* لمناطق السودانية.

لazالت تتواجد أعداد كبيرة (مشاهد) في الجنوب المغربي وتونس، مرتبطة بالتشكلات الصحراوية من السنغال إلى التشاد على شكل مشكاك من التجمعات التي تظهر بوضوح الواحدة عن الأخرى . جفاف الصحراء هو الذي ابعد وفرق اصل هذه التجمعات البدائية السنطيات.

يتمثل جنس *الـ Acacia* أو الطحة بـ 5 أنواع كلها تتواجد في المناطق الشبه جافة وهي كلها مشوكة :

• **السنط المغربي** *Acacia gommifera ou gomia marocain*

متوطن للمغرب حيث يتواجد في منطقة شاسعة، على شكل شجيرات مدغלה ذات 1 إلى 2 م علوا ويستطيع أن يصبح شجرة ذات 5 إلى 6 م علوا.

يتواجد في الهضاب الجافة من المغرب الأقصى والجبال المنخفضة المحاذية لجنوب أم الربيع .

• سنت راديانا أو تورتيليس (*Acacia raddianna ou tortilis*) (الطلحة) تتوارد بالجزائر في منطقة الساورة، اين تشكل مفازة جافة، تمتد إلى الجنوب الغربي إلى جانب بعض الأشجار.

في الهقار الجزائري هذه الشجرة قد تصل إلى علو 7 إلى 13 م وقطرها 40 إلى 50 م قمتها كثيفة وممتدة على شكل مظلة يصل قطرها 10 م. الثمرة مدور على شكل حلزوني، والشجرة تثمر بكثرة.

• السنط السيال أو نمات (*Acacia seyal*) يظهر على شكل دغل، لا يتجاوز علوه 3 إلى 4 م، الجزء متفرع من القاعدة، ذات قشرة سمراء تزول بسهولة، الثمرة غير دائرية مقوسة ومحنوعة بين البذور، ينتج عدد قليل من الثمار كما انه ينبع الصمغ ...

• السنط أبيدا أو الأبيض (*Acacia albida*) نوع استوائي يتواجد في السنغال، في شمال إفريقيا نجد في الجنوب الغربي المغربي قد يصل إلى علو كبير، ذات قشرة بيضاء أورمادية .

• السنط فانيسيا : (*Acacia farnesiana*) ذات أصل أمريكي وأسيوي ... قد ادخل إلى شمال إفريقيا والشرق. في المغرب قد اصبح شبه طبيعي في حور السوس.

ما يجب أن تعرفه :

- تلعب مجموعات الـ *Acacia* دور اقتصادي واجتماعي مهم جداً في حياة الرحل الذين يستعملون الصمغ والحطب.
- عن طريق مركبها الجذري يتأسلم هذا النبات، يجذب المياه بعمق من التربة (عدة أمتار للبعض على بعد 80 م عمقاً) وذلك لوصول المياه الجوفية الأعمق.
- يستعمل للتثمير في المناطق الجافة، رغم الجفاف، والقلع، فان عددها دورى وتبعاً لكمية الأمطار، ولكن الضغط المستمر قد يسبب إتلافها وبذلك تدهور التوازن البيئي.
- في الساحل، التعايش بين الـ *Acacia* والفطريات الأرضية يمكن استغلاله لتحسين تخصيب التربة.

للمزيد من المعلومات :

- Paul OZENDA, 1954 - *La flore et végétation du Sahara*.
- Paul Bondy, 1948 - *Economie forestière nord africaine*.
- Revue sécheresse n°3, vol 7 - 1996.



إعداد : نبيلة بروان

المنسق الوطني : زهير صفال

الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة

ص ب رقم 115 النصر الجزائري الهاتف : 67 43 69 / 67 40 72

الحركة الايكولوجية الجزائرية ص . ب 203 16070 الجزائر

الهاتف والفاكس (02) 60 46 50

المنسق الجهوي : عبد الحميد بلملينج

جمعية الرفق بالحيوان والحافظة على الطبيعة "SPANA" 41 ، تجزئة الزهرة، هر هو رة 12000 تمارة
المغرب الهاتف : 74 72 09 (212-7). الفاكس : 74 74 93 (212-7). العنوان الإلكتروني : spana@mtds.net.ma